

醫

燈

續

焰

醫燈續焰卷十八

補遺

錢塘後學潘楫碩甫補

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人

陳潘杲中旋

校

馮子異西平

正文病類多矣。考之方書。尚缺多種。皆屬常見之疾。何可竟無方治。今補入。

哨雜

醫燈續焰

卷十八

陸地舟

嘈雜一證。有火。有痰。有飲。有虫。雖云多種。而源則不離乎脾胃。膏粱之人。每多患此。其發也。如饑之欲食。甚則煩沸雜亂。與吞酸。吐酸。乾嘔。胃痛等疾。皆為噎膈反胃之漸。宜三聖丸。越鞠丸之類。挾痰者。二陳加梔連。挾飲者。丹溪導飲丸。挾虫者。烏梅圓酒煮黃連丸之類。

附方

三聖丸 治嘈雜神効

白朮 四兩

橘紅 一兩

黃連 炒五錢

右爲細末。神麴糊丸。如菉豆大。每服七八十丸。食遠津唾下。薑湯亦得。

越鞠丸

見第四十一

二陳湯

見第十六

丹溪導飲丸 治水飲嘈雜

吳茱萸

錢三

白茯苓

錢一

黃連

錢五

蒼朮

炒一兩

獨活

錢七

右爲細末。神麴糊丸服。

烏梅圓

見第六十三

酒煮黃連丸

見第五十五

吞酸吐酸

吞酸與吐酸大同小異。吞酸酸在胸胃。忽作忽止。黃胃刺心。吐酸酸水酸物。隨吐而出。味如醃醋。近喉輒齒。是皆形寒胃冷。食鬱飲停。穀氣不分。中焦鬱會。正猶釀酒不發。過時而成酸味也。吞酸之所以異者。吞則胃中飲少。吐則胃中飲多耳。間有

方甚妙

火者。乃熱不得散。屬木者。乃氣不得伸。火不散者。發之。木不伸者。達之。故統宜溫中散寒。令鬱滯開。而病自愈矣。宜發明藿香安胃散加減二陳湯三因鞠朮丸二陳加萊連神麴蒼朮方酒煮黃連丸

附方

藿香安胃散 見第二十

加減二陳湯 治痰飲爲患。嘔吐。頭眩。心悸。或因食生冷。脾胃不和。吞酸吐酸等證。

丁香一兩 半夏 陳皮各五兩

茯苓三兩 甘草一兩半

右咬咀。每服四錢。水煎。入生薑三片煎服。

三因麴朮丸 治中脘宿食留飲。酸蜚心痛。口吐

清水。

神麴炒三兩 蒼朮泔浸三宿洗淨日乾炒一兩半

右為末。生薑汁別煮神麴糊為丸。薑湯送下。

二陳加茱連神麴蒼朮方

陳皮一錢 白茯苓一錢 蒼朮炒一分

黃連吳茱萸汁炒一錢 神麴炒一錢

水二鍾。生薑一片。煎八分服。

酒煮黃連丸 見第五十五

噎膈

噎者。食入不利。或捱塞而下。或負痛而納。其病在喉。膈者。食雖入膈。或氣逆。或滿悶。或隱痛。或得噉少寬。或得吐反快。其病在膈。二疾多並見。噎者必

膈。膈者必噎也。卽謂胃之先驅。積鬱沉憂。氣結不散。久久成此。張雞峰方論曰。此病不在外。不在內。不屬冷。不屬熱。不是實。不是虛。所以藥難取効。多緣憂思志怒。動氣傷神。氣積於內。動則諸證見。氣靜疾平。手捫之而不得疾之所在。目視之而不知色之所因。耳聽之而不知音之所發。故鍼灸藥石。皆不獲効。乃神意間病也。肯哉言乎。

宜生薑半夏湯香和寬中。

湯五弱寬中散。蘇神嘉禾散。絕音補氣運脾湯。代抵當丸之類。選用。

附方

生薑半夏湯 止嘔吐開胃消食

半夏

生薑

各三錢

右咬咀水二盞煎七分服

統旨香砂寬中湯 治氣滯胸痞噎塞或胃寒作

痛

木香

臨服時磨水入藥三四匙

白朮

炒

陳皮

香附

各一錢五分

白豆蔻

去殼

砂仁

去殼

青皮

檳榔

半夏

白茯苓

各一錢

厚朴

薑製一錢二分

甘草

三分

水二鍾薑三片煎八分入蜜一匙食前服。

和劑五隔寬中散 治七情四氣傷于脾胃以致

陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五隔并治

一切冷氣。

白豆蔻

去皮二兩

甘草

五兩

木香

三兩

厚朴

去皮薑汁炒一斤

縮砂仁

去發

丁香

青皮

去白

陳皮

去白各四兩

香附子

炒去毛十六兩

右爲細末。每服二錢。薑三片。鹽少許。不拘時。沸

湯點服。

和劑藪神嘉禾散 治脾胃不和。胸膈痞悶。氣逆

生痰。不進飲食。或五噎五膈。

白茯苓

去皮

縮砂仁

去皮

慧苡仁

炒

枇杷葉

去毛薑汁炙香

人參

去蘆各一兩

白朮

炒二兩

桑白皮

炒

檳榔

炒

白豆冠

皮炒去

青皮

白去

穀蘖

炒

五味子

炒各半兩

沉香

杜仲

去皮鹽汁酒塗炙

丁香

藿香

隨風子

石斛

酒和炒

半夏

薑汁搗和作餅炙黃色

大腹子

炒

木香

各七錢半

甘艸

炙二兩

陳皮

白去

神麴

炒各二錢半

每服三錢。水一盞。薑三片。棗二枚。煎七分。不拘。

時溫服。五噎。入乾柿一枚。膈氣吐逆。入礮白三寸。聚五枚。

統旨補氣運脾湯 治中氣不運。噎塞。

人參

錢二

白朮

錢三

橘紅

茯苓

各一錢五分

黃耆

蜜炙一錢

砂仁

去皮八分

甘草

四分

有痰加半夏麴

錢一

水二鍾。薑一片。棗一枚。煎八分。食遠服。

代抵當丸

治瘀血噎膈。食下疼痛。

方見第二十

自汗

自汗者。不因勞動。不因天暑。不因熱飲食。時時汗自出。故曰自汗也。乃衛氣虛而不能固密。心液因之漏泄。宜當歸補血湯倍黃耆玉屏風散保元湯黃耆建中湯之類若表中風

邪者。亦能令衛腠空疎。而汗時自出。此邪去則汗

止。宜桂枝湯

附方

當歸補血湯 見第十六

得効玉屏風散 治自汗。

防風

黃耆

各一兩

白朮

炒二兩

每服三錢水二盞薑三片煎六分不拘時溫服。

保元湯 治自汗無休止。

黃耆

蜜炙三錢

人參

二錢

甘草

炙一錢

水二盞煎七分溫服。

黃耆建中湯 見第三十三

桂枝湯

見第十九

解盜汗之因
無刺聲

盜汗

盜汗者。睡中偷出。多發於夜。如盜之乘人不覺而
夜出也。屬陰虛。蓋人之衛氣。晝行於陽。出外。夜行
于陰。入內。入內則內熱。內熱則不足之陰受其蒸。
入內則表虛。表虛則蒸泄之液無從固。於是陰失
其守。陽失其衛。而汗淋漓于睡夢間者有矣。宜當歸六

黃湯大建
中湯之類

附方

當歸六黃湯 治盜汗久不愈。面白黃。肌瘦。或夜熱。骨蒸。飲食減少。四肢無力。足膝酸疼。發無虛夜。服此神効。

當歸

生地黃

熟地黃

黃檗

黃芩

黃連

各一錢

黃耆

二錢

右作一服。水二鍾。煎一鍾。臨卧服。

大建中湯 治虛熱盜汗。百節酸疼。肢體倦怠。日

漸羸弱。口苦舌澁。心怔短氣。

綿黃耆

炙

遠志

燈心煮
去心

當歸

酒洗

澤瀉

各二錢

白芍藥

龍骨

煨

人參

各一錢五分

炙甘草

一錢

右作一服。水二鍾。薑五片。煎一鍾。食前服。氣弱。

加炮附子

二錢

腰痛筋急。加官桂。

去皮一錢

悸怔忡

準繩云。悸卽怔忡。今歷觀病狀。則二證少有分別。

悸則心中微動如恐如驚。怔忡則心胸振築。莫知其來。忽爾寧寂。莫知其去。甚則頭目眩暈。神氣若浮。蓋悸之重者也。大抵因痰積飲停。氣衝火擊所

致。

宜導痰湯。溫膽湯。茯苓甘草湯。薑朮湯之類。

亦有中氣虛而忡悸者。

宜補中益氣湯。四君子湯。六君子湯。小建中湯。黃耆建中湯之類。

亦有心經氣血

不足。火不定。神不安而忡悸者。

宜四物湯。朱砂丸。當歸補血湯。經駁

定心丹

有心液過耗。汗多亡陽。脉代而忡悸者。

宜

甘草

湯

附方

導痰湯

見第四十一

溫膽湯

見第二十

茯苓甘草湯

治心下停水忪悸

白茯苓

去皮

桂枝

各三錢

生薑

半兩

甘草

二錢

水二鍾煎一鍾不拘時服

薑木湯

治停飲怔忡

白薑 生

白朮

茯苓

半夏 麴

各一錢

桂

甘草

各五分

水一鍾。薑三片。紅棗一枚。煎六分。不拘時服。

補中益氣湯 見第三十九

四君子湯 見第十六

六君子湯 見第十六

小建中湯 見第六十九

黃耆建中湯 見第三十三

四物湯

見第二十一

朱雀丸

見第五十一

當歸補血湯

見第十六

經驗定心丹

楫自製

茯神

去皮木
一兩

遠志

酒浸
心五錢
去

人參

去蘆
八錢

沉香

黑重
三錢
沉水者
不見火

龍骨

煨七
錢

懷生地

洗去土
一兩半

當歸身

酒洗
一兩

白芍藥

酒炒
八錢

丹參

去蘆
一兩

桂枝

去骨
三錢

甘草

炙二
錢

荷蘆

出水而未開者焙乾一個

爲極細末。煉蜜爲丸如菉豆大。用上好水飛過朱砂爲衣。每服二錢。食遠白湯下。午後勿服。此方驗過多人矣。

炙甘草湯

見第三十三

健忘

道過之言。行過之事。久不記憶曰忘。若當下卽不能記。索之胸臆。了不可得者。健忘也。乃心虛腎憊。

水火不交。精血之府空。榮衛之道澁。致令機關不

利。靈巧不開。高年衰朽者。多得之。

宜歸脾湯。讀書

九。開心散之類。亦有痰血癖積。礙其機關而成者。此又不

以年高論也。

宜壽星丸。導痰湯。代抵當丸。選用。

附方

歸脾湯

見第五十八

讀書丸

石菖蒲

兎絲子

煮酒

遠志

酒浸去心。各一兩。

地骨皮

去骨洗淨二兩

生地黄

五味子

川芎

各一兩

右爲末。薄糊丸。桐子大。每服七八十丸。臨卧白

湯下。

朱雀丸

見第五十一

二參丸

治健忘。養神定志。和血安神。外華腠理。

天門冬

去皮

熟地黄

酒蒸

丹參

各一兩半

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

各一兩

遠志

酒浸去心

人參

去蘆各半兩

右爲細末。煉蜜和丸如桐子大。以朱砂研極細。

水飛過半兩。爲衣。每服五十丸。加至百丸。空心。

煎愈風湯送下。

愈風湯係潔古方。其方三十三味。皆風藥。繁雜之甚。故不錄。今

只以白湯送之

開心散 治好忘。

石菖蒲

一兩

白茯苓

去皮二兩

遠志

去皮

人參

去蘆各二錢半

右爲細末。每服一錢。食後米飲調下。

壽星丸

治痰滯經絡多忘。

方見第五十八

導痰湯

見第四十一

代抵當丸

治瘀血喜忘。

方見第二十

不寐

難經四十六難曰。老人寤而不寐。少壯寐而不寤者。何也。然經言少壯者。血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝日精。夜不寤。老人血氣衰。

肌肉不滑。榮衛之道澹。故晝日不能精。夜不寐也。

故知老人不得寐也。宜八珍湯歸脾湯之類。虛勞虛煩不得

眠者。宜仲景酸棗仁湯。膽虛驚悸不寐者。宜溫膽湯六君子湯之類。痰

飲停中。煩惑不合目者。宜內經半夏湯導痰湯之類。

八珍湯 見第十六

歸脾湯 見第五十八

仲景酸棗仁湯 治虛勞虛煩不得眠。

酸棗仁 二升 甘艸 一斤 知母

茯苓

芍藥 各二兩
有生薑二兩 澤瀉

右五味。以水八升。煮酸棗仁得六升。內諸藥。煮三升。分溫三服。

溫膽湯

見第二十

六君子湯

見第十六

內經半夏湯 治陰陽之氣偏勝。不相和諧。陽不

得入陰。故不瞑不寐。服此陰陽通。卧可立至。黃

帝所謂決讀壅塞。經絡大通。陰陽和得者也。亦

經信不
轉樞
之

治痰氣阻塞。陽不入陰。成上證。大抵轉動樞機。則陰陽自諧矣。其湯方。以流水千担。以外者八升。揚之萬遍。取其清五升。煮之。炊以葦薪火。沸置秫米一升。秫米北人謂之黃米。可以釀酒。治半夏五合。徐炊。令竭爲一升半。去其滓。飲汁一小杯。日三。稍益。以知爲度。故其病新發者。覆杯則臥。汗出則止。久者。三飲而已也。

導痰湯 見第四十四

死

死。卽賊也。有火。有痰。飲有寒。有蟲。有食。有胃虛。有腎虛。種種不同。但虛寒者。十九。然必細察得之久。暴聲之遠近。形之盛衰。及病之所由起。則施治自多効也。蓋潛行默運。無聲無臭者。中氣之常也。若有所激。氣卽爲火。易其常性。卒暴上衝。仍欲其潛行默運。無臭無聲。安可得乎。至若痰飲停中。礙其清道。陰寒迫裏。遏其陽升。或蛔卒動而氣阻。或食

暴入而氣壅。或胃氣虛於上而氣不舒。或腎氣虛

於下而氣不續。皆能撓挫運機。行不順利。而呃呃

之聲。有自來矣。故因於火者。其聲頻以促。兼面赤

而脉數。

宜二陳湯加山茱萸黃連之類

因於痰飲者。其聲緩勻。兼

吞酸面澤而脉滑。

宜二陳湯溫膽湯導痰湯之類

因於陰寒者。其

聲短。而聲呃呃不揚。兼面色青白。惡寒而脉緊。

宜

陳湯加乾薑丁桂之類

因於五者。其聲或作或止。或緩或促。

兼面色不一。胃中或痛。或吐清水冷涎。或心中嘈

雜脉遲數大小不定

宜二陳湯去甘草加吳茱萸製黃連乾薑細辛之類

因

於食者其聲濁而頻嘔兼噦逆酸腐惡食面黃脉

緊滑

宜和劑枳實半夏湯藳陳皮法製枳實之類

因胃氣虛寒

者其聲促而無力或得食少止面青白畏寒脉緩

弱無力

宜六君子湯四君子湯芩皮竹茹湯理中湯紫古柏錢散之類

因腎氣虛

寒者其聲遠而長或作或止半刻一聲臍下或動

築面黑腰疼或足冷惡寒脉沉微

宜金匱腎氣丸良方參附湯之類

類

附方

二陳湯

見第十六

溫膽湯

見第二十

導痰湯

見第四十一

和劑枳實半夏湯

枳實

炒

半夏

各等分

加麥蘖

炒

每服七錢。水二盞。薑五片。煎八分。溫服。無時。

麴蘖枳朮丸

見第二十

法製陳皮 消食化氣。寬利胸膈。美進飲食。

茴香 炒

甘艸 炙各二兩

青鹽 炒一兩

乾生薑

烏梅肉 各半兩

白檀香 二錢半

右六味爲末。外以陳皮半斤。湯浸去白。淨四兩。切作細條子。用水一大盞。煎藥末三兩。同陳皮條子。一處慢火煮候。陳皮極軟。控乾少時。用乾藥末拌勻。焙乾。每服不拘多少。細嚼。溫薑湯下。無時。

法製檳榔 治酒食過度。胸膈膨滿。口吐清水。一

切積聚。

雞心檳榔 一兩切 作小塊

硝砂 仁取

白豆蔻 仁取

丁香 切作細條

粉草 切作細塊 各一兩

陳皮 去白切 作細條

生薑 切作細條 各半斤

鹽 二兩

右用河水二碗。浸一宿。次日用慢火。砂鍋內煮

乾。焙乾。入新瓶收。每服一撮。細嚼酒下。或為細

末。湯調服亦可。

六君子湯

見第十六

四君子湯

見第十六

橘皮竹茹湯

治胃虛寒。嘔逆。或呃。

陳皮

升二

竹茹

升二

大棗

枚三十

生薑

斤半

甘草

兩五

人參

兩一

以水一斗。煮取三升。溫服一升。日五服。

理中湯

見第十七

潔古柿錢散

治胃虛寒呃逆。

柿錢

丁香

人參各等分

右爲細末。水煎。食後服。

金匱腎氣丸

見第十六

良方參附湯 治陽氣虛寒。自汗惡寒。或手足逆冷。大便自利。或臍腹疼痛。呃逆不食。或汗多發
瘧等證。

人參

兩一

附子

炮五錢

右薑棗水煎。徐徐服。去人參。加黃耆。名耆附湯。

面

夫手足六陽之脉皆上至頭而面爲諸陽之會。胃足陽明之脉又起於鼻之交頰中故面獨能耐寒也。設反惡寒及面寒者胃寒惡熱及面熱者胃熱面寒者面多青白面熱者面多赤面黃而斑駁者胃中虫積面黃而已食如饑者胃疸面腫者胃風面瘡者胃火膏粱積熱以胃脉起於面故面病多屬胃亦有面瘡之屬脾肺風熱面塵之屬肝膽燥

熱面黧黯之屬風濕痰飲。又不獨一陽明胃也。宜
後方選對證者主治之。

附方

升麻胃風湯 治胃風面腫或麻木牙緊目咽。

升麻

錢二

白芷

當歸

葛根

蒼朮

各一錢

甘草 一錢

柴胡

藥本

羌活

黃蘗

草豆蔻

各三分

麻黃

不去節 五分

蔓荊子

二分

薑一片。棗一枚。水二盞。煎七分。食後服。

升麻順氣湯 治憂思。飲食失節。面色黧黑。心懸

氣促。

升麻

一錢半

乾葛

防風

白芷

黃耆

人參

各一錢

白芍藥

六分

甘草

蒼朮

各五分

水二盞。薑一片。大棗一枚。煎七分。食遠溫服。

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱。口唇頰車髮

鬚腫痛。及鼻額間連頭面痛。口不可開。雖能言

語。有妨飲食。亦治面熱。

犀角 七錢

川升麻 半兩

防風

黃芩 各三錢半

香白芷

白附子

川芎 各二錢半

羌活 三錢一字

生甘草 一錢半

右咬咀。都作一服。水五盞。煎至三盞半。去滓。分

作三服。一日一服。訖。其證必減。如藏府有些滯

不妨足陽明胃經也。經云。腸胃爲市。又云。陽明
多血多氣。胃之中。腥羶五味。無所不納。如市廛
無所不有也。六經之中。血氣似多。腐熟飲食之
毒。聚於胃。故此方以犀角爲主。升麻佐之。入胃
經。餘藥皆滌除風熱。用之有效也。

補胃湯 治胃虛脛寒。面目浮腫。亦治面寒。

柏子仁

防風

細辛

桂心

陳皮

各一錢

川芎

吳茱萸

人參

各一錢半

甘草

五分

水二鍾煎七分食遠溫服。

茯苓桂枝五味子甘艸湯加大黃治欬逆倚息不

得卧面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面故耳。

七白散 治面黧而垢。

白欬

白朮

白牽牛

白附子

白芷

白芍藥

白殭蠶

各等分

爲末。每用五錢煎湯洗之。

洗面藥 治面生黧黯。或生小瘡。或生拂癢。粉刺。

皮膚癢癢面垢。

皂角

三斤

升麻

八兩

楮實子

五兩

萊豆

白芨

白芷

天花粉

各一兩

甘松

砂仁

白丁香

各五錢

三奈

三錢

右爲末。糯米飯搗丸。如彈子大。量用洗面。

面上五色瘡方

用鹽湯綿浸塌瘡上。日五六度。

面上豆痕或斑點方

用蜜佗僧細末。夜以人乳汁調敷。

面上粉刺方

用不語唾塗之。或搗兔絲子汁塗。或以白礬末

少許酒調塗。

不語唾。恐是平旦未言語先者。

斗門方 治黑黧令面色好

白殭蠶

黑牽牛

北細辛

各等分

爲粗末，作澡豆，又去小兒胎穢。

指爪破面方

用生薑自然汁調輕粉敷破處，無瘢痕。

又方

橄欖汁敷之，無痕。

平胃散

面瘡水調平胃散塗之。

白附子散 治面上熱瘡似癰。或生赤黑斑點。

白附子 蜜佗僧 白茯苓

白芷 定粉等分

右爲末。先用蘿蔔煎湯洗面。淨後用羊乳調。至夜敷患處。次早洗去。効。

祛風白芷散 治面上風癰瘡。

白芷 黃連 黃藥

黃丹 錢各二 茯苓 一錢五分

輕粉 一錢

右爲細末。用油調搽癰瘡上。或加孩兒茶二錢。麝香二分亦可。

目

靈樞大惑論曰。五藏六府之精氣。皆上注于目而

爲之精。精之窠爲眼。

窠者窩也。聚精成窩。搏結之義。

骨之精爲瞳

子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。

大小赤絡。

其窠氣之

精爲白眼。肌肉之精爲約束。裹攢。

上下眼胞。爲目約束。筋骨

血氣之精而與脈并爲系。

衆精并脈以系于目。

上屬於腦後。

出于項中。又曰。瞳子黑眼法于陰。白眼赤脉法于陽。故陰陽合轉而精明也。觀是論。則後人診眼疾而分五輪八廓者。蓋本乎此。其所云氣輪者。金精之騰結也。卽經所謂窠氣之精爲白眼。白眼屬肺。肺主氣。故曰氣輪。肺在行爲金。金至堅。故白珠獨堅實。風輪者。木精之騰結也。卽經所謂筋之精爲黑眼。黑眼屬肝。肝主筋。在行爲木而應風。故曰風輪。風性動。故黑睛左右不定而色帶青也。血輪者。

道微曰中底
經真瞳子之
跡家也

火精之騰結也。卽經所謂血之精爲絡。絡屬心。心
主血。故曰血輪。心在行爲火。火有君相二種。故岐
分于兩角。無正輪也。肉輪者。土精之騰結也。卽經
所謂肌肉之精爲約束。裹擷屬脾。脾主肌肉。故曰
肉輪。脾在行爲土。土包萬物。該四藏。四藏皆爲裹
束。故開則動而萬用。閉則靜而萬寂矣。水輪者。水
精之騰結也。卽經所謂骨之精爲瞳子。瞳子屬腎。
腎主骨。在行爲水。故曰水輪。水爲天一之精。故獨

得居中。內有大絡六。以通心肺脾。肝。腎。命門。中絡

六。以通膽。胃。大小腸。三焦。膀胱。外有小細之絡。莫

知其數。

其絡向明視之了了可數。卽禽獸異類皆有此也。

皆血貫於腦。下

連藏府。通暢血氣。往來以滋於目。故凡病目。則有

形色。經絡顯見。而可驗內之何藏。何府受病。外有

二竅。以通其氣。內涵諸液。出而爲淚。更有神膏。神

水。神光。真氣。真精。皆滋目之源液也。神膏者。目內

包涵膏液。破則黑稠水出。由膽中滲潤精汁積成。

涵養瞳神。衰則有損。神水者。由三焦發源。先天真一之氣所化。在目之內。不可得見。觸物損破。則見黑膏。形如稠痰。在目之外者。卽目上潤澤之水也。水衰。則有火勝燥暴之患。水竭。則有目輪大小之疾。耗澁。則有昏眇之危。虧者多。盈者少。神光者。目自視之精華也。心火發源。膽火用事。夫神之于人也。亦大矣。不獨一視爲然。卽行走執捉。言笑聽聞。無神宰率。則塊然一形而已。真血者。職藏在肝。升

數服之生成
如秋水出

以滋目。指五藏六府經絡之血。非肌腠散漫之血。故曰真也。真氣者。以經絡滋養。必先氣响而後血濡。卽發生真一之元氣也。真精者。卽先後二天。真元化汁。根於腎。施於膽。以及瞳仁之精也。凡此數者。一有所損。則目病矣。大槩目形圓而長。外有堅殼數重。中含清脆。內包神膏。膏外神水。水外皆血。血以滋水。水以滋膏。膏內一點黑瑩。卽是腎膽所聚之精華也。唯此一點。空明淨徹。燭照無窮。是曰

水輪。然必三者具而後靈明全。三卽膽汁。腎精。心神也。五輪足而外應溥。五卽氣。風。血。肉。水也。合之渾然。分之井然。水爲體。火爲用。氣爲運動。神爲維持。妙合陰陽。光同日月。午前小。午後大。隨天地之盈虧。男左勝。女右勝。別陰陽之稟賦。至若剛柔壽夭。詐直智愚。皆能以目驗知。神哉實乎。更有八廓。其說以八卦八方。內配藏府。分別經絡。似亦有理。前五輪說中。已悉其義。今不更贅。唯錄八廓之名。

以備考證。一曰傳送廓。應乾卦。位居西北。絡通大腸而屬肺。二曰津液廓。應坎卦。位居正北。絡通膀胱而屬腎。三曰會陰廓。應艮卦。位居東北。絡通上焦而配屬命門。四曰清淨廓。應震卦。位居正東。絡通膽而屬肝。五曰養化廓。應巽卦。位居東南。絡通中焦而配屬肝絡。六曰胞陽廓。應離卦。位居正南。絡通小腸而屬心。七曰水穀廓。應坤卦。位居西南。絡通胃而屬脾。八曰闢泉廓。應兌卦。位居正西。絡

通下焦而配屬腎絡。以六配八。餘二無配。重肝絡。腎絡配之者。蓋目根源於腎。專竅於肝。故較他藏。爲獨勝焉。已上五輪八廓之生成配合也。知此。則知內傷者。內動藏氣。災及五輪。外感者。不從藏變。外邪先襲於絡。由絡及廓。由廓及輪。故內傷見證。不腫不痛。痛亦不甚。或視物漸覺不明。或遇晚卽爲矇眊。俗名雞盲亦名雀目或羞明畏日。或不能久視。遠視或澁不欲開。或眼胞收小。或倒睫拳毛。或青翳白。

以此數節能
胸中領聖眼
科專門却步
惟矣

膜。或白珠黃色。黑睛藍色。或瞳仁散大。或緊小。或
欹側。或兩眦脂糊。或弦爛。或淚流。或視物以一爲
二。以紅爲白。以正爲斜。以曲爲直。種種由漸而成
者。屬內傷藏也。陰也。外感見證。則發如風火。癢痛
不堪。或中如砂石。或外見瘡瘍。或脂淚不時。或星
障卒起。或向天目如針刺。或近燈燭如火烘。或兼
鼻塞齒疼。或兼身熱頭痛。種種卒暴而來者。屬外
感。府也。陽也。是故病府者易愈。病藏者難瘳。藏則

視其何藏何因。府則視其何邪何絡而後調之。散之。補之。瀉之。溫涼升降。在圓機者。自爲斟酌也。方

附方

簡易補肝散 治肝虛目睛疼。冷淚不止。筋脉痛。及羞明怕日。

夏枯草

錢五

香附子

兩一

右爲末。每服一錢。臘茶調下。服無時。

本事菊花散 治肝腎風毒氣上衝眼痛。

甘菊花

牛蒡子

炒各八兩

防風

三兩

白蒺藜

去刺一兩

甘草

一兩五錢

右爲細末。每服二錢。熱水調下。食後臨卧。

瀉青丸

治眼暴發赤腫疼痛。

方見第四十九

局方湯泡散

治肝經風熱上壅。眼目赤澁睛疼。

多淚

赤芍藥

當歸

黃連

各等分

右爲末。每二錢湯頓調。熱洗。日三五次。御藥院方。加荊芥。

湯泡散 治肝經風熱攻眼。赤腫羞明。漸生翳膜。

杏仁

防風

黃連

去

赤芍藥

當歸尾

各半兩

銅青

二錢

薄荷葉

三錢

右剉散。每用二錢。極沸湯泡。乘熱先熏後洗。冷則再煖用。日兩三次。一方入白鹽少許。閉目沃。

洗鹽亦散血。

分珠散 治眼患血灌瞳神惡血不散。

槐花

白芷

地黃

梔子

荊芥

甘艸

黃芩

龍膽草

赤芍藥

當歸

各一兩

右水煎服。春加大黃瀉肝。夏加黃連瀉心。秋加

桑白皮瀉肺。

清涼散

冰瑕深翳

蔓荊子

荊芥

苦竹葉

甘艸

各半兩

梔子

半二錢

右薄荷水煎服。

二黃散 治努肉攀睛

黃芩

大黃

防風

薄荷

各等分

右水煎入蜜少許食後服。

照水丸 治翳神驗

海螵蛸

蛤粉

南康真者 片腦 半
各五分

黃蠟

五分

右末先熔蠟攪微冷。入末和爲丸。如麻子大。帶
匾些。臨卧納眼中。翳膜上。次日照水自落。

千金磁珠丸 治神水寬大漸散。昏如霧露中行。

漸覩空中有黑花。漸覩物成二體。久則光不收。
及內障。神水淡綠色。淡白色者。

此方效過亦

磁石

吸針者

辰砂

神麴

先以磁石置巨火中煨醋淬七次晒乾另研極

細二兩辰砂另研極細一兩生神麴末三兩與

前藥和勻更以神麴末一兩水和作餅煮浮爲

度搜入前藥煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸

加至三十丸空心飯湯下

按此方磁石法水入腎朱砂法火入心而

神麴專入脾胃乃道家黃婆媒合嬰姁之理或加沉香半兩升降水火尤佳

煮肝散 治內外障翳眼

右用豬肝二兩。批開。以夜明砂末二錢七。摻在
肝內。麻繩縛定。用水一盞。煮令肝轉色白。取出
爛嚼。用煮肝湯送下。食後服。

洗眼方 治內外障翳膜赤脉昏澁。

右以桑條於二三月間採嫩者。曝乾。淨器內燒
過。令火自滅。成白灰。細研。每用三錢。入磁器。或
銀石器中。以沸湯泡。打轉候澄。傾清者入於別
器內。更澄。以新綿濾過。極清者。置重湯內令熱。

開眼淋洗。逐日一次。但是諸眼疾皆効。

菊睛丸 治肝腎不足。眼昏。常見黑花。多淚。

枸杞子

三兩

茯苓

酒浸炒

巴戟

去心各一兩

甘菊花

兩

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸。溫酒

鹽湯食遠任下。余太宰方。加熟地黄二兩。

駐景丸 治肝腎虛。眼昏翳。

熟地黄

車前子

各三兩

兔絲子

酒煮五兩

爲末煉蜜丸。桐子大。每服五十九。食前白茯苓石菖蒲湯任下。又方加枸杞子一兩半尤佳。

枸杞子酒 治肝虛當風眼淚。

右用枸杞子最肥者二升搗破。內絹袋置罐中。以酒一斗浸訖。密封勿泄氣。候三七日。每日取飲之。勿醉。

地芝丸 治能遠視不能近視亦能治脉風成癰。

生地黄

焙

天門冬

去心各四兩

枳殼

炒

甘菊花

去蒂各二兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服一百丸。茶清

送下。

定志丸 治能近視。不能遠視。

遠志

去苗心

菖蒲

各二兩

人參

白茯苓

去皮各一兩

爲細末。煉蜜丸。以朱砂爲衣。每服十丸。加至二

十丸。食後米飲下。

耳

素問陰陽應象大論曰。腎主耳。在竅爲耳。靈樞脉
度篇曰。腎氣通於耳。腎和。則耳能聞五音矣。五閱
五使篇曰。耳者。腎之官也。金匱真言又曰。南方赤
色。入通於心。開竅於耳。是耳一也。爲兩藏共開之
竅。豈非心腎交通。水火相濟之義乎。若二藏不和。
虛實寒熱。皆能上致耳疾。卽經絡之過於耳者。亦
皆能作疾。如靈樞經脉篇曰。小腸手太陽之脉。入

耳中其病耳聾。三焦手少陽之脉。從耳後入耳中。出走耳前。其病耳聾。渾渾焯焯。大腸手陽明之别脉。入耳。合宗脉。實則齟齬。口問篇曰。耳中鳴者。宗脉之所聚也。胃中空。則宗脉虛。虛則下溜而脉竭。故上虛而鳴。選方四首。

附方

清神散 治風氣壅上。頭目不清。耳常重聽。

僵蚕

菊花

兩各一

荆芥

羌活

水通

川芎

香附

防風

藜蘆

甘草

各二錢

爲末。每三錢。食後臨卧茶清下。

磁石湯

治腎虛耳聾。面黑。幾不欲食。腰脇背痛。

磁石

五味子

杜仲

白朮

白石英

各二錢

黃耆

白茯苓

各一錢

水煎服

益腎散 治腎虛耳聾

磁石

巴戟

沉香

菖蒲

川椒

各一兩

爲末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹煨熟空心細嚼酒下

犀角飲子 治風熱上壅耳聾腫痛膿水流由

犀角

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆

井菊花

各五分

井艸

二分半

薑煎溫服

鼻

素問金匱真言曰西方色白入通於肺開竅於鼻
陰陽應象大論曰肺主鼻在竅爲鼻脉度篇曰肺
氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣五藏別論曰五
氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻爲不利也氣厥

論曰膽移熱於腦則爲辛頰鼻淵經脉篇曰胃足
陽明之脉起於鼻之交頰中其病爲鼽衄大腸手
陽明其病亦爲鼽衄膀胱足太陽亦爲鼽衄又曰
脾熱者鼻先赤選方七首

附方

通氣湯 治鼻塞不聞香臭

羌活

獨活

蒼朮

防風

升麻

葛根

各六分

白芷

甘草

川椒

各二分

冬月加麻黃二八薑棗葱白煎服

防風散 治鼻淵腦熱滲下濁流不止

防風

五分

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

各二分

爲末食後沸湯調服

單南星飲 治風邪入腦宿冷不消鼻內結物壅

塞腦氣遂流濁髓

南星爲細末每二錢用棗七枚并脾少許同煎
食後服三四服其物自出涕自收外貼華撥餅

華撥

香附

大蒜

等分

搗作餅紗襯灸熱貼顙門上用熨斗火熨透其
涕自止

瓜礬散 治鼻痔肉化水自下

瓜蒂

四錢

甘遂

一錢

白礬

枯

螺殼

錢四

草烏尖

各五分

爲末真麻油調丸如鼻孔大每日一次以藥入
鼻內令將痔肉上

芷莢散

治鼻流濁涕

白芷

一兩

辛夷

錢五

蒼耳仁

半三錢

薄荷

五分

爲末每二錢葱茶清調服

鼻衄不止方

鮮生地搗汁飲之立止蘿蔔汁無灰酒和服陰
煉人中白溫湯調服及單飲童便俱妙

口脣

金匱真言論曰中央黃色入通於脾開竅於口五
藏生成論曰脾之合肉也其榮脣也六節藏象論
曰脾胃之華在脣四白脉度篇曰脾氣通於口脾
和則口能知穀味矣經脉篇曰大腸手陽明之脉
挾口交人中其病爲口乾胃足陽明之脉挾口交

承漿其病口喎唇診

診即審診字通用

足少陽病爲口苦

足太陰終者唇反衛氣失常篇曰唇青黃赤白黑
黑者病在肌肉選方四首

附方

瀉白湯 治大腸實熱便結臍痛口瘡

橘皮

竹茹

黃芩

山梔

黃蘗

各五分

芒硝

茯苓

各一錢

生地黃

三錢

薑棗煎服

黃檗散 治頭屑

黃檗

二兩

五倍子

密陀僧

各二錢

甘州

二分

爲末水調塗黃檗上炙乾再塗藥盡爲度後將黃檗切作薄片貼頭屑上

五福化毒丹 見第七十八

冰檗丸 治口舌生瘡

黃蘗

薄荷

礪砂各等分

冰片

減半

爲末蜜丸彈子大每噙化一丸

舌

陰陽應象大論曰心主舌在竅爲舌脉度篇曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣夫言出于心非舌不能發故云舌者心之苗其色赤其形尖而善動火之象也經脉篇曰脾足太陰之脉連舌本散

舌下其病舌本強及舌本痛腎脉循喉嚨挾舌本其病口熱舌乾口問篇曰少陰脉至則嚙舌已上一目耳鼻口舌爲藏之開竅固當見五藏之變病所謂五藏不和則七竅不通然而經絡病多藏氣病少若識別不真卽有毫釐千里之謬唯諦審而治之則善矣選四方與第七十八小兒門參看

附方

薄荷煎 治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

薄荷 二兩

川芎 二錢

甘草

砂仁 各二錢半

片腦 五分

各另為末和勻蜜調成膏任意嚼嚥

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

玄參

天門冬

麥門冬

各等分

為末蜜丸彈子大每一丸綿裹喻化津液下

薤白仁湯 治風熱在腭唇口瞶動或結核

薤白仁

防已

赤小豆

甘艸等分

加生薑煎服

舌血舌腫舌出方

炒槐花細末摻之卽止腫脹者蒲黃末摻之患
熱病多舌出不能入者冰片擦之愈

齒

齒者骨之餘骨不外露齒質乃骨而外露故曰餘
如唇爲肉餘爪爲筋餘髮爲血餘俱內藏者餘出

而外露也氣則不言餘以氣呼出可見耳腎主骨
故齒屬腎言其本也胃足陽明之入上齒齦大腸
手陽明之入下齒齦言其經也是故本病者多病
齒骨經病者多病齒齦然有虛實風火虫蝕之不
同在診之細爲分別則無不効選方七首

附方

清胃湯

見第四十九

香鹽散

治虫牙及腎虛宜露一切齒疾

香附三兩

青鹽五錢

謝傳笑去散 治牙疼

乳香 沒藥 雄黃

胡椒 烏藥 兩頭尖各等分

爲末擦牙初時甚痛良久涎出便愈。

白蒺藜散 治風虛牙疼齒齦搖動。

白蒺藜生搗去刺篩末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時漱。

青白散 治一切牙疼。及漱水洗目尤妙。

青鹽

二兩

白鹽

四兩

用川椒四兩煎汁拌炒二鹽爲末擦之。

齒縫出血

一名牙宣

唯以白鹽擦之妙。

齒肉壅出

鮮生地黃汁一碗。牙皂角數銖。火上炙熱。蘸汁再炙再蘸盡汁焙燥末之。傅上立消。

鬚髮

素問五藏生成論曰。腎之合骨也。其榮髮也。上古天真論曰。腎氣實。齒更髮長。是髮爲屬腎。又心主血。髮者血之餘。是髮又屬心。髮生上指。象火。用心過度者。髮早白。皆心之驗也。巢氏云。膽之榮在鬚。又靈樞曰。衝任二脉。不榮於口脣者。故鬚不生焉。是鬚髮雖殊。總不外榮血之爲潤養也。選方五首附方

天寶單方

治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰
壅每發卽頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先
灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法
春末夏初收白菊軟苗陰乾搗末空腹取一方
寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若
不飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收
暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中

經七日服之。日三次。常令酒氣相續爲佳。

巨勝丸 治風眩能返白髮爲黑

巨勝子

白茯苓

甘菊花

等分

煉蜜丸如桐子大。每服三錢。清晨白湯下。

旱蓮膏 黑鬚髮益腎陰。

旱蓮草。用泉水煮汁熬膏。日服外。卽以膏搯之。

地黄膏 久服烏鬚髮。

生地黄

三斤搗取汁

茜草

一斤水五大盞煎絞取汁滓再煎二三次取汁

合二汁。緩火煎如膏。以瓶盛之。每日空心。溫酒服半匙。一月髭鬚如漆。

筆峰雜興方

用何首烏雌雄各半斤。分作四分。一分用當歸汁浸。一分生地黄汁浸。一分旱蓮汁浸。一分人乳浸。三日取出。各暴乾。瓦焙。石臼搗末。蒸棗肉和。丸梧子大。每服四十丸。空心百沸湯下。

附擬補內外因第九六淫方

陰淫上下厥逆中外寒慄

附子理中湯

見第十七

四逆湯

見第二十二

陽淫狂譫煩渴血泄浸淫

白虎湯

見第四十三

犀角地黄湯 治小腸淋瀝出血疼痛及心血妄

行吐血衄血等疾食後臨卧服。

犀角

如無以升麻代之半兩

白芍藥

二錢

牡丹皮

半兩

生地黄

二錢

右剉作一服水一盞煎八分空心服。

風淫肢廢毛落紫習癰瘰

寶鑑醉仙散 治癰風遍身麻木。

胡麻子

炒

牛蒡子

炒

枸杞子

蔓荊子

炒各一兩

白蒺藜

苦參

防風

瓜蒌根

各五錢

右爲細末。每一兩四錢。入輕粉二錢。拌勻。每服

一錢茶清調。晨午各一服。至五七日。於牙縫中
出臭涎。令人如醉。或下膿血。病根乃去。仍覺病
之輕重。人之虛實。用病重者。須先以再造散下
之。候元氣將復。再用此藥。忌一切炙煇厚味。止
可食淡粥時菜。諸蛇以淡酒蒸熟食之。可以助
藥力。

通天再造散 治大風惡疾

鬱金

半兩

大黃

煨一兩

皂角刺

黑大者炒一兩

白牽牛

六兩半
生半炒

爲末。每服五錢。日未出。面東。無灰酒調下。

兩溼。腹滿腫脹。腸鳴濡瀉。

平胃散

見第四十七

五苓散

見第十七

胃苓湯

見第十七

晦淫百合狐惑熱中藏燥

金匱百合病論曰。百合病者。百脉一宗。悉致其病。

也。意欲食。復不能食。常默默欲卧。不能卧。欲行。不能行。飲食或有美時。或有不用。聞食臭。時如寒。無寒。如熱。無熱。口苦。小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脉微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。

百合知母湯 百合病發汗後者至此方

百合七枚 知母三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯 百合病下後者至此方

百合七枚 滑石三兩綿裹 代赭石如彈丸大一枚

碎綿裹

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石代赭取一升。去滓。後合重煎。取一升五合。分溫再服。

百合雞子湯 百合病吐後者。至此方。

百合七枚

雞子黃一枚

右先水洗百合。漬一宿。當沫出。去其水。更以泉

水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分
溫服。

百合地黄湯 百合病不經吐下發汗病形如初
者主此方

百合七枚

生地黃汁一升

右以水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升
五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

狐惑之爲病狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不用飲食。惡聞食臭。其面目乍赤。乍黑。乍白。蝕於上部則聲喑。一作

甘草瀉心湯主之。

甘草

四兩

黃芩

人參

乾薑

各三兩

黃連

一斤

大棗

十二枚

半夏

半升

二
蝕於下部。則咽乾。苦參湯主之。

蝕於肛者。雄黃薰之。

雄黃

右一味爲末。筒瓦二片合之。燒向肛薰之。

脈經云。病人或從呼吸。上蝕其咽。或從下焦蝕其肛。陰蝕上爲感。蝕下爲狐。狐感病者。猪苓散主之。

病者脈數無熱。微煩。默默但欲卧。汗出。初得之。

三四日。目赤如鳩眼。七八日。目四眦黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

赤小豆當歸散

當歸

赤小豆

三升浸令芽出曝乾

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

金匱甘麥大棗湯 治婦人喜悲傷。欲哭。象如神

靈所作。數欠伸。名曰藏躁。

甘草

兩

小麥

一升

大棗

十枚

右三味。以水六升。煮三升。溫分三服。亦補脾氣。明澤。恍惚動悸。錯妄失神。

金匱桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯。治驚狂不安。陽氣散失。或因灸熨火邪而陽氣浮越。致成上證。

桂枝

三兩
去皮

牡蠣

二兩
炙

龍骨

四兩

牡蠣

五兩
熬

龍骨

四兩

大棗

十二枚

蜀漆

三兩
洗去腥

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆減二升。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。

東垣朱砂安神丸

見第十九

醫燈續焰卷十八

終

醫燈續焰

卷十八

三十三

陸通